

PARA GADO DE CORTE

TOPLINE®

Carrapaticida e inseticida

Fórmula: Cada 100 mL contém:

Fipronil.....1,0 g
Corante Diazóico Vermelho.....0,04 g
Veículo q.s.p.....100,0 mL

Vias de administração e modo de usar

Modo de usar: Produto pronto para uso. Estabelecer a dose de 1 mL/10 kg de peso vivo (correspondente a 1mg/kg) e aplicar no dorso do animal, no espaço entre a 1^a vértebra torácica e a última lombar.

Dose: Aplicar 1 mL do produto pronto para uso, para cada 10 kg de peso vivo. Dose mínima: 10 mL

Esquema de dosificação	kg / Animal	Dose / mL
0-100 kg		10 mL
150 kg		15 mL
200 kg		20 mL
250 kg		25 mL
300 kg		30 mL
350 kg		35 mL
400 kg		40 mL
450 kg		45 mL
500 kg		50 mL
Acima de 500 kg		1 mL para cada 10 kg de peso vivo

Produto com coloração vermelha que identifica por 3 a 5 dias o animal tratado. **Indicações:** *Topline® - Carrapaticida e Inseticida* é indicado para tratamento e

controle das infestações causadas pelos seguintes ectoparásitos dos bovinos de corte: carapatos (*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*), bernes (*Dermatobia hominis*), moscas-dos-chifres (*Haematobia irritans*), piolhos mastigadores (*Damalinia bovis*) e piolhos sugadores (*Linognathus vituli*). Também é indicado na prevenção de bicheiras causadas por *Cochliomyia hominivora*, quando aplicado em períodos de alto risco, tal como durante a castração.

Restrições de uso e período de carência:

- Não usar em vacas produtoras de leite para consumo humano.
- Não usar em vacas e novilhas destinadas à produção leiteira até 3 meses antes do parto.
- Não abater os animais para consumo humano até 172 dias após a última aplicação.
- *Topline Carrapaticida e Inseticida* é exclusivo para bovinos de corte.
- Não utilizar em outras espécies animais.

Advertências e precauções:

- Uso externo. Não administrar por via oral ou injetável.
- A intensidade da coloração vermelha varia conforme a cor e o tipo da pelagem do animal.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- O intervalo entre tratamentos deve ser de no mínimo dois meses.
- Evitar fumar, alimentar-se ou beber durante o manuseio do produto.
- Não usar a embalagem vazia.
- Não armazenar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos e produtos de higiene doméstica.
- Durante o uso, manter a embalagem sempre em posição vertical.

Prazo de validade após a primária abertura da embalagem primária:
36 meses.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar.

Apresentações: Frasco plástico contendo 1 litro com copo dosador ou bombona plástica contendo 5 litros.

USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO

Licenciado no MAPA desde 08/05/1996.
Registrado sob o n° SP 000023-0.000039.

Resp. Técn.: Simone B. Zampieri
CRMV-SP 19.996

Fabricante:
Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
Rd. Raposo Tavares, Km 113
Araçoiaba da Serra - SP
CNPJ 64.687.015/0001-52 -
Ind. Brasileira

Proprietário e Distribuidor:
Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.
Av. Dr. Roberto Moreira, 5005, Recanto dos Passáros - Paulínia/SP
CNPJ 57.600.249/0001-55
Indústria Brasileira

SAC: 0800 888 7387

©Topline é marca registrada
Grupo Boehringer Ingelheim.



Boehringer
Ingelheim