



TOPLINE
SPRAY

USO VETERINÁRIO

Produto larvícida, bernicida e antimicrobiano, apresentado em tubos de aerossol, para bovinos e equinos.

Formula: Cada 100 mL contém:

Fipronil.....0,32 g
Sulfadiazina de prata.....0,09 g
Alumínio.....3,10 g

Veículo q.s.p.100 mL

Descrição: Topline® Spray é administrado por via tópica sendo eficaz na prevenção e tratamento de bicheira (miases não furuncular) causada por larvas da mosca *Cochliomyia hominivora* e no tratamento de berne (miases furunculares) causada por larvas da mosca *Dermatobia hominis*.

Indicações de uso: Produto larvícida, bernicida e antimicrobiano indicado para:

-Tratamento curativo de bicheiras (miases não furunculares) causadas por larvas de *Cochliomyia hominivora* e de berne (miases furunculares) produzidas pelas larvas de *Dermatobia hominis*.

-Tratamento preventivo contra bicheiras (miases não furunculares) em ferimentos em geral ou feridas cirúrgicas como castração, descornos, caudectomia (corte do rabo), marcação a fogo e no tratamento do umbigo de bezerros neonatos.

-Infeções epidêmicas associadas à microrganismos Gram-positivos como *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus haemolyticus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis* e *Trueperella pyogenes*, e à microrganismos Gram-negativos como *Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Proteus mirabilis* e *Pseudomonas aeruginosa*.

Modo de usar: Agitar bem o tubo e retirar a tampa protetora. Com o tubo a aproximadamente 10 cm de distância, pressionar a válvula e direcionar o jato para a região a ser tratada, pulverizando por 5 (cinco) segundos. No caso de miases não furuncular (bicheira) instalada, recomenda-se limpar bem a ferida, removendo larvas e aplicar Topline® Spray para atingir áreas mais profundas e cobrir toda superfície acometida. Normalmente não é necessária uma segunda aplicação, mas em casos de altas infestações de bicheira, é recomendável examinar o animal após o tratamento inicial e repetir a aplicação, se necessário.

Contra-indicações: Não utilizar em animais produzindo leite para o consumo humano.

Precauções: Nas condições normais de uso, o produto não apresenta efeitos colaterais para os animais aos quais se destina. Manipular com cuidado. Conteúdo sob pressão. Não fumar, beber ou comer durante a aplicação. Não usar ou guardar próximo ao calor ou chama. Não colocar a embalagem no fogo ou incinerador. O produto não deve ser inhalado ou pulverizado nos olhos. Não usar a embalagem vazia. Não guardar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene. Conservar em local fresco e seco, a abrigo da luz solar. Produto inflamável. Aplicar a favor do vento. Lavar as mãos após a utilização do produto.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

Após a abertura, utilizar o produto até a data de validade.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ORIENTAÇÃO DO MEDICO-VETERINÁRIO.

Apresentação: Tubo contendo 400 mL (320 g) de suspensão para uso externo (tópico) na forma de spray.

Licenciado no MAPA desde 20/10/1997.
Registrado sob o número SP 00023-0.000027
Resp. Téc.: Simone B. Zampieri - CRMV-SP 19.996

Fabricante: Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Rod. Raposo Tavares, Km 113 Araçoiaba da Serra - SP
CNPJ: 64.687.015/0001-52 - Indústria Brasileira

Proprietário: Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.
Av. Doutor Roberto Moreira, 5005
Recanto dos Pássaros - Paulínia/SP
CEP: 13148-914
CNPJ 57.600.249/0001-55 - Indústria Brasileira
SAC: 0800 888 7387

NÃO CONTÉM CFC
Boehringer
Ingelheim
INOFENSIVO PARA A CAMADA DE OZÔNIO



Perigo
Gás extremamente inflamável
Manter a afastada das fontes de calor e ignição.
Não fume.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do telefone SAC: 0800 888 7387

